

## ***Вакцинация во время беременности***

Женщине, планирующей беременность, необходимо оценить вакцинальный статус, риск заражения и последствия перенесённой инфекции с целью определения необходимости и вида вакцинации.

***Ревакцинация от дифтерии и столбняка*** проводится каждые 10 лет. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от дифтерии и столбняка следует проводить не менее, чем за 1 месяц до ее наступления.

***Вакцинация от гепатита В*** проводится трехкратно по схеме 0-1-6 месяцев. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от гепатита В следует начинать не позднее, чем за 7 месяцев до ее наступления.

***Вакцинация от краснухи*** проводится женщинам, ранее не привитым или привитым однократно и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от краснухи следует провести не позднее, чем за 2 месяца до планируемой беременности.

***Вакцинация от кори*** проводится женщинам моложе 35 лет (женщинам некоторых профессий в возрасте моложе 55 лет), ранее не привитым, привитым однократно и не болевшим.

***Применение комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита*** у женщин требует предохранения от беременности в течение 1 месяца после введения вакцины.

***Вакцинация от ветряной оспы*** проводится женщинам ранее не привитым и не болевшим. При подготовке к планируемой беременности вакцинацию от ветряной оспы следует провести не позднее, чем за 3 месяца до планируемой беременности.

***Вакцинация от COVID-19*** проводится пациенткам, планирующим беременность, и беременным пациенткам вакцинами для профилактики COVID-19 с актуальным антигенным составом согласно инструкциям к лекарственным препаратам.

Рекомендована в сезон гриппа вакцинация вакцинами для профилактики гриппа пациенткам, планирующим беременность за 1 месяц до планируемой беременности, и беременным пациенткам во 2-м-3-м триместре беременности (в группе повышенного риска – начиная с 1-го триместра беременности).

Вакцинация беременных женщин против кори, краснухи, паротита, ветряной оспы не проводится.

Вакцинация от дифтерии, столбняка, коклюша, клещевого энцефалита, пневмококковой и менингококковой инфекции, гепатита А и В проводится только в случае высокого риска инфицирования и отсутствии вакцинации на прегравидарном этапе.

Вакцинами, содержащими живые ослабленные вирусы вакцинировать беременных не рекомендуется. В то же время искусственное прерывание беременности при непреднамеренном введении вирусных вакцин, содержащих ослабленные штаммы (вакцины против коронавируса, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, гриппа и др.) в связи с тем, что риск прерывания беременности значительно выше риска развития неблагоприятных последствий после вакцинации.